

Marcelo Rodrigues Martins^a

Álano Almeida Andrade^b

Nathalie de Lourdes de
Sousa Dewulf^a

Wilsione José Carneiro^a

Adriana do Prado Barbosa^c

Luiz Carlos da Cunha^a

^aUniversidade Federal de Goiás
(UFG), Faculdade de Farmácia.

^bFaculdade Estácio de Sá - Goiás

^cHospital das Clínicas Universidade
Federal de Goiás.

*Autor para correspondência: Luiz
Carlos da Cunha- NEPET,
Faculdade de Farmácia –
Universidade Federal de Goiás,
Praça Universitária, Qd. 62, Goiânia,
Goiás, Brasil. 74.605-220. E-mail:
lucacunha@gmail.com. Telefone:
+55(62)84882371.



Congresso de Ciências
Farmacêuticas do Brasil Central



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO

Endereço: BR-153 – Quadra Área
75.132-903 – Anápolis –
revista.prp@ueg.br

Coordenação:
GERÊNCIA DE PESQUISA
Coordenação de Projetos e Publicações

Publicação: 19 de setembro de 2013

Modalidade: Pós-Graduação

FATORES QUE LEVAM A NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO COM INIBIDOR DE TIROSINO QUINASE EM PORTADORES DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA

FACTORS THAT LEAD TO NO TREATMENT COMPLIANCE WITH INHIBITOR TYROSINE KINASE IN PATIENTS WITH CHRONIC LEUKEMIA MYELOID

RESUMO

Introdução e objetivos: A LMC é uma neoplasia caracterizada pela presença do cromossomo philadélfia¹. O tratamento revolucionário, foi após a descoberta da oncoproteína BCR-ABL que permitiu o desenvolvimento de novos fármacos². Contudo, para se obter respostas o paciente deve ser aderente ao tratamento³. O objetivo foi identificar o que levou os pacientes portadores de LMC a não adesão ao tratamento. **Metodologia:** todos os pacientes que deixou de buscar o medicamento por um dia, foi considerado como não aderente. Estes foram convidados a responder o que levou a não pegar o medicamento na data agendada. Aprovação do CEP-HC UFG nº 073/2012. **Resultados e discussões:** os pacientes ao serem questionados, responderam que às vezes esqueciam de tomar, paravam o medicamento nos dias em que iriam ingerir bebida alcoólica, alguns por residirem no interior tinham dificuldade de locomoção, falta de flexibilidade nos dias da entrega do medicamento. Sendo contrastado com encontrado na literatura, em que relata diversos fatores que remetem a não adesão em idosos, mas no entanto somente a dificuldade de locomoção coincide com os dados encontrados neste estudo⁴. **Conclusões:** a identificação das dificuldades relatadas poderá gerar ações para que seja melhorada a adesão, visando assim uma boa evolução no tratamento, bem como a contribuição na redução de custos com o tratamento. **Agradecimentos:** Grato à FAPEG, pelo apoio financeiro a este projeto.

Palavras-Chave: Leucemia Mielóide Crônica, Não adesão terapêutica, Inibidores de Tirosino Quinase

ABSTRACT

Introduction and Objectives: The LMC is a neoplasm characterized by the presence of chromosome philadélfia¹. The revolutionary treatment was after the discovery of BCR-ABL oncoprotein which allowed the development of new drugs². However, in order to obtain responses is necessary that the patient is adhering to treatment³. The goal was to identify what led CML patients to treatment no compliance. **Methodology:** All patients who failed to get medication for a day, was considered non-adherent. They were invited to participate in the study and to answer which led to not take the medicine on the scheduled date. Authorization of CEP-HC UFG 073/2012. **Results and discussions:** patients when questioned, answered that they sometimes forgot to take, stop the medication on days when they would drink alcoholic beverages, some because they live inside had limited mobility, lack of flexibility in the days of the delivery of the drug. As contrasted with other studies, in which reports several factors that lead to no adherence in the elderly, yet only limited mobility coincides with the data found in this study⁴. **Conclusions:** identification of difficulties reported can generate actions to be improved adhesion, thereby targeting a good evolution in treatment as well as the contribution in reducing treatment costs. **Acknowledgments:** I thank FAPEG, for financially supporting this project. **Keywords** Chronic Myeloid Leukemia, no adherence, Inhibitor Tyrosine Kinase.

¹BORTOLHEIRO, T. C., CHIATTONE, C. S. Leucemia Mielóide Crônica: história natural e classificação. **Rev. bras hematol hemoter**, v. 30, n. 1, p. 3-7, 2008.

²BOLLMAN, P. W., GIGLIO, A. DEL. Leucemia mielóide crônica: passado, presente, futuro. **Einstein**, v. 9, n. 2, p. 236-243, 2011.

³SPECTOR N. Análise crítica das recomendações formuladas por um painel de experts para o cuidado clínico de pacientes com Leucemia Mielóide Crônica. **Rev bras hematol hemoter**; v. 30, n.1, p. 8-12, 2008.

⁴ALMEIDA, H. O., Versiani, E. R., Dias, A. R., Novaes, M. R. C. G., Trindade, E. M. V., Adesão a Tratamentos entre Idosos. **Comunicação em Ciências da Saúde**. v. 18, n.1. p. 57-67, 2007.